

UROTRAC® PLUS

Acido Pipemídico / Fenazopiridina

QUIMIOTERAPICO ANALGESICO URINARIO

FORMULA

Cada cápsula contiene:

Acido pipemídico.....	400 mg
Fenazopiridina clorhidrato.....	100 mg
Excipientes.....	c.s

PROPIEDADES

El ácido pipemídico en combinación con la fenazopiridina, es un excelente quimioterápico de las vías urinarias, que con la combinación de un analgésico produce un rápido alivio de la sintomatología que acompaña a estas infecciones, tales como disuria (dolor), quemazón, polaquiuria.

Actúa sobre las mucosas inflamadas eliminando el ardor, tenesmo y dolor durante la micción.

Ejerce una acción bactericida, actuando sobre el ADN bacteriano, impidiendo la replicación, en microorganismos Gram positivos y Gram negativos, comprometidos en las infecciones urinarias mixtas, incluyendo Pseudomonas.

INDICACIONES

UROTRAC® PLUS está indicado en las infecciones de las vías urinarias bajas, agudas o recidivantes: cistitis aguda o crónica, uretritis, prostatitis, pielonefritis, causadas por gérmenes sensibles como Escherichia coli, Proteus mirabilis e indologenes, Klebsiella, enterobacter, Citrobacter.

Complicaciones infecciosas causadas por cálculos renales, sondas o endoscopia. Prevención post-quirúrgica.

En general todas las infecciones mencionadas que requieran eliminar el dolor y el ardor.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION

Dosis: Administrar según prescripción médica o bien:

Una cápsula cada 12 horas con abundante agua (mañana y noche).

Duración del tratamiento: Según la gravedad de la infección.

Via de administración: Oral

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Usar exclusivamente en adultos. A causa del riesgo teórico de fotosensibilidad es aconsejable, evitar exponerse al sol.

EFFECTOS ADVERSOS

Pueden aparecer molestias gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarreas y gastralgia; estas manifestaciones no requieren suspensión del tratamiento.

Raramente pueden observarse manifestaciones alérgicas: rash, prurito y dermatitis alérgica.

Sistema hematopoyético: anemia hemolítica y metahemoglobinemia.

Sistema hepatico: ictericia y hepatotoxicidad.

Otros efectos adversos son los siguientes: edema de Quincke, shock anafiláctico; fotosensibilidad; alteraciones neurosensoriales como vértigo y trastornos del equilibrio. Estas manifestaciones son raras y ceden al suspender el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

No debe ser utilizado en los niños, menores de 15 años.

También está contraindicado en el primer y ultimo mes del embarazo; en pacientes con nefropatías y hapatopatías graves., pacientes con hepatitis, pacientes con insuficiencia renal grave.

Hipersensibilidad al ácido pipemídico o a las quinolonas. Pacientes con clearance de creatinina menor a 10 ml/min.

INTERACCIONES

No potencia el efecto de los anticoagulantes por su muy baja unión a las proteínas plasmáticas.

Aumenta la vida media de la cafeína y teofilina.

La administración de antiácidos que contienen sales de magnesio y aluminio reducen la absorción de ácido pipemídico; probablemente, los antagonistas H₂ producen un efecto similar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente no mayor a 30° C en lugar fresco y seco.

PRESENTACION

UROTRAC® PLUS caja x 50 cápsulas.

Fabricado por:
GRUPO ALCOS S.A.

División:
LABORATORIOS ALCOS
www.grupoalcos.com
info@grupoalcos.com

Regente Farmacéutico:
Dr. Cosme Liendo R.

Autorizado por el Ministerio de Salud
Registro Sanitario: NN-25153/2007

La Paz - Bolivia

